

# ПОМОЩЬ ПРИ ЧЕРЕПНО-МОЗГОВОЙ ТРАВМЕ

Черепно-мозговые травмы бывают **открытыми и закрытыми**

! При ушибе головой наблюдаем за ребенком в течение 24 часов

**Опасные симптомы**, которые могут появиться в этот период и которые будут свидетельствовать об ушибе или сдавливании мозга:

- ! Кратковременная потеря сознания
- ! Головная боль, головокружение которые не проходят в течение 40 минут
- ! Рвота более одного раза
- ! Нарушение сознания (нарушение координации, рассеянное внимание)

# ПОМОЩЬ ПРИ ОТКРЫТОЙ ЧЕРЕПНО-МОЗГОВОЙ ТРАВМЕ

## Симптомы:

- Деформация черепа
- Трещина в черепе
- Кровоподтеки в области глаз (дуги), за ушами, прозрачная жидкость из носа или ушей
- Если после падения возник насморк, это может быть вещество, которое содержит мозг
- Если рана в области головы длиннее 2 см и шире 7 мм или между краями ран есть расхождение, обращаемся к врачу

**Что делать:** Вызываем скорую медицинскую помощь и осуществляем обездвиживание головы

# ОБЩАЯ ПОМОЩЬ ПРИ ТРАВМАХ

1

Провести **подробный осмотр** ребенка

2

Приложить **холод** (не более 20 мин)

3

При травмах шейного и позвоночного отдела **нельзя перемещать ребенка**, если ему не угрожает опасность

4

При травмах конечностей **остановить наружное кровотечение и обеспечить неподвижность** места перелома с помощью шин и подручных средств

5

При подозрении на перелом костей таза ребенок укладывается **в положение лягушки** с подложенным под колени валиком

6

**Ждать приезда скорой помощи**

!

При вывихах и переломах **ничего не вправляем**.  
Проводим иммобилизацию конечности и ждем приезда скорой помощи