

ПОМОЩЬ ПРИ КРОВОТЕЧЕНИИ ИЗ НОСА

Голову ребенку не запрокидываем – кровь может попасть в желудок, что спровоцирует рвоту

- 1 Усадить ребенка, наклонив его голову вперед
- 2 Сжать крылья носа на 15-20 минут или вставить ватные валики
- 3 Приложить к переносице холод
- 4 Ребенок должен сплевывать кровь
- 5 Если кровь не останавливается в течение 15 мин, вызвать скорую помощь

ПОМОЩЬ ПРИ РАНЕНИИ ГРУДНОЙ КЛЕТКИ

При попадании в грудь инородного тела, которое задевает легкое

Симптом: сквозная рана, из которой идет свист

Что делать:

- ❖ Рану надо закрыть предметом, который не будет пропускать воздух (пакет, пленка)
- ❖ Усадить пострадавшего в положение полусидя или полулежа, чтобы ему было комфортно
- ❖ Ослабить одежду

- ! Пить, есть нельзя
- Инородное тело из раны доставать нельзя

ПОМОЩЬ ПРИ ВНУТРЕННЕМ КРОВОТЕЧЕНИИ

Симптомы:

- Кратковременная потеря сознания (1-2 мин)
- Уплотнения, синяки в области живота
- Кровь в кале
- Сильная жажда
- Тошнота, рвота
- Сильная боль, которая не проходит в течение часа

Что делать: Садимся в машину, едем в травмпункт или вызываем скорую помощь.

Пить, есть категорически запрещено

ПОМОЩЬ ПРИ РАНЕНИИ ЖИВОТА

- 📌 Положение полусидя, полулежа
- 📌 Кишки не вправлять, накрыть влажной тряпкой, контролируем состояние пострадавшего
- 📌 Пить, есть нельзя
- 📌 Вызвать скорую помощь