

# ПОЛНАЯ И ЧАСТИСНАЯ АСФИКСИЯ

**Частичная** – когда человек в состоянии кашлять, значит, дышать (например, ситуация, когда ребенок подавился во время еды).

Лучший способ при частичной асфиксии – позволить откашляться (10-15 секунд).

Если состояние ухудшается, кашель превращается в хрип, ребенок начинает синеть или бледнеть, требуется помощь.

**Признаки полной асфиксии:** текут слезы, лицо синеет, ребенок не может дышать, через какое-то время лопаются капилляры.

# СТЕНОЗИРУЮЩИЙ ЛАРИНГИТ «ЛОЖНЫЙ КРУП»

Круп бывает ложный и истинный

| Истинный  | Ложный   |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"><li>• Возникает на фоне перенесенной дефтерии</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>• Возникает на фоне развития ОРЗ, гриппа, бронхита</li></ul> |

**Симптомы:** лающий сухой кашель с хрипом

**Чем опасен:** у детей до 6-7 лет из-за особенностей физиологии связки в гортани находятся близко друг к другу, и в результате стенозирующего ларингита они смыкаются, что приводит к стенозу гортани и асфиксии.

**Задача:** увлажнить связки

**Способы:**

1. Завести ребенка в ванную комнату, включить горячую воду и дать ему дышать над паром (посадить ребенка рядом, не в воду), что обеспечит увлажнение связок. Вызвать скорую помощь
2. 2. Дать использовать ингалятор с физраствором, после чего все равно вызвать скорую помощь
3. 3. Обеспечить приток свежего воздуха – выйти на улицу, балкон, открыть окно

В рамках первой помощи **мы не имеем право советовать медикаменты**. Но если у ребенка есть препараты, прописанные педиатром, родители должны заранее проинформировать добровольца, что требуется ребенку и в какой ситуации.